

## TORNFALKSRAPPORT 1992

År 1992 var det åttonde året med systematisk insamling av tornfalksobservationer och det andra året med jämförbar holktäthet i 11 atlasrutor i Kvarkenområdet.

Dessvärre var år 1992 också det tredje dåliga sorkåret i rad i Vasanejden. Sorkstammarnas svaga ökning, som börjat sommaren 1991, kom av sig medan den fjärde Eurovintern dolde i tö det som tidigare vintrar dolt i snö.

Inventeringsarbetet förlöpte rätt bra förutom att holkarna i en atlasruta p.g.a. tidsbrist inte genomgicks.

I fältarbetet deltog: R. Wistbacka, Johan Ahlqvist, Pertti Malinen, Patrik Majabacka och Ole Andtfolk. Uppgifter erhöles också av Kari Palo och Kari Ketola samt av ONK/Allan Stenmark.

### Resultat

Förekomsten kommunvis år 1992 kan studeras i nedanstående tabell:

Kommun	Häckningar	(Holkantal)	Revir	Totalt
Oravais	0	( 10)	1	1
Maxmo	0	( 2)	0	0
Vörå	0	( 32)	2	2
Norra Korsholm	0	( 25)	2	2
Södra Korsholm	1	( 46)	0	1
Malax	15	(137)	0	15
Korsnäs	2	( 47)	2	4
Norra Närpes	6	( 32)	1	7
Västra Jurva	1	( 3)	0	1
Bergö skärgård	3	( 23)	0	3
Valsörarna	0	( —)	1	1
Mickelsörarna	0	( 8)	0	0
<b>Totalt</b>	<b>28</b>	<b>(365)</b>	<b>9</b>	<b>37</b>

Förekomsten var som vanligt rikligast i södra Malax och norra Närpes med endast obetydlig förekomst i andra kommuner. Antalet häckningar var ungefär lika många eller rättare lika få som 1991.



*Specialholkar för tornfalkar underlättar falkarnas häckning.*

Detsamma gäller för skärgården. På Valsörarna sågs ett par under häckningstid men holkarna genomgicks inte heller detta år.

Det senaste verkligt goda tornfalksåret i Bergö skärgård var år 1979 medan förekomsten år 1989 var rätt god.

I södra Vöra har Tomas Klemets satt upp 18 tornfalksholkar varav de flesta på ladgavlar. 2 häckningar hittades redan första året men de var på "fel" sida av gränsen till Storkyro. I södra Närpes var förekomsten rätt dålig och Ole Andtfolk fann endast 2 häckningar i sina 50 holkar i kommunen.

Häckningarna lyckades ungefär lika bra som år 1991 förutom de tre häckningar som hittades i myr/hyggesbiotoper. En av dem övergavs under ruvningen, en plundrades under kläckningen medan någon predator (mård?) idkade predation på drygt veckogamla ungar i den tredje. Den sistnämnda holken var bebodd tredje året i rad.

I en ladholk dog ungarna under häckningen, troligen p.g.a. att föräldrafågeln förolyckats.

I det egentliga undersökningsområdet söder om Vasa ringmärktes eller kontrollerades 33 föräldrafåglar och 98 boungar.

### Förekomsten i olika atlasrutor (10x10 km)

Antalet holkar är drygt 1/100 ha åkermark.

Atlasruta	Namn	Holkantal	Bon	Revir	Totalt
696:20	Harrström	20	0	2	2
697:20	Korsnäs	25	2	0	2
697:21	Velkmoss	27	3	0	3
697:22	Saneliden	31	4	1	5
697:23	Iso Sarvineva	30	4	2	6
698:21	Petalax	13	0	0	0
698:22	Kråkbacken	34	9	0	9
698:23	Långåminne	28	1	0	1
699:22	Yttermalax	41	1	0	1
699:23	Rimal	25	1	0	1
700:22	Sundom	19	0	0	0
701:24	Vallvik	25	0	1	1
702:24	Västerhankmo	(genomgicks inte)			

Data: R. Wistbacka, Kari Palo, Kari Ketola och Ole Andtfolk.

Förekomsten var tydligt lägre detta år. Antalet par/ruta var nu i medeltal 2,7 då det år 1991 var 3,8.

Nämnvärt är att ruta 698:22 Kråkbacken åter en gång hörde till de tätast bebodda. Det verkar inte vara några dåliga år i den rutan. Det dåliga sorkåret 1990 hittades där hela 6 bon och år 1991 hittades 7 bon och 1 revir.

## Norra Österbotten

I norra Österbotten har Johnny Björk och Sten Vikström & Co inte mindre än 15 atlasrutor inrättade för tornfalksuppföljning.

Förekomsten i dessa var som i Kvarken lägre än år 1991. Som mest hittades 9 par i en ruta och som minst 0 par. Medeltalet par/ruta var år 1991 3,1 och år 1992 2,7.

Atlasruta (Namn)	Holkantal	Bon	Revir	Totalt
Bredviken	9	0	0	0
Kronoby	25	2	2	4
Rödsö	12	1	0	1
Storforsen	36	3	2	5
Nedervetil	45	5	2	7
Snåre	6	0	1	1
Marinkainen	59	6	1	7
Kälviä	45	7	2	9
Jolkka	22	0	0	0
Salonkylä	12	0	0	0
Vuolle	28	2	3	5
Honkiperä	16	0	0	0
Lintukangas	13	0	0	0
Jylhä	15	1	0	1
Väli-Kannus	12	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>355</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>40</b>

I Larsmo skärgård hade Rune Jakobsson m.fl. satt upp ett flertal tornfalksholkar och i dessa hittades 4 bon. Ytterligare hittades 2 bon i kråkbön samt 1 revir. Förekomsten var ungefär likadan år 1991 och bägge åren klart större än förekomsten i Bergö skärgård som ansetts som något av ett Eldorado för tornfalkar. Riktigt lika glädjande är förekomsten i Larsmo inte då den uppkommit som en följd av stora kalhyggen på skärgårdsholmarna.

## Ännu mera holkar?

Österbottens kustland börjar nu ha ett rätt väl täckande holknät som medger en utvärdering av förekomsten i de flesta kommuner. I Kristinestad-Närpes har bröderna Lillandt inlett utsättande av tornfalksholkar och i Kronoby har den lokala naturklubben kompletterat holkbeståndet.



*En välfödd tornfalksunge klar för ringmärkning.*

Med tanke på en helhetsöversikt vore det säkerligen ändamålsenligt att försöka komplettera de områden som lider av en viss holkbrist. En sådan kan skönjas i delar av Oravais och norra Vörå men framförallt i Nykarleby och Pedersöre.

Detta skulle också förutsätta nya intresserade tornfalksvänner i dessa kommuner. Vad vore väl bättre än att någon ornitolog tog sig an tornfalkarna i dessa områden och speciellt då i Nykarleby och Pedersöre som är så att säga helt outforskade men ändå innehåller goda biotoper.

### **Tack**

Ett stort tack riktas till Societas Pro Fauna & Flora Fennica, Ostrobothnia Australis och miljövårdsnämnden i Kronoby för ekonomiskt stöd!

Litteratur: Tornfalksrapport 1991, OA natur 1992 årg. 9.